

แนวทางการป้องกันและรักษา

การควบคุมโรค PRDC ต้องทำหลายอย่างประกอบกัน:

การจัดการและป้องกัน

- โปรแกรมวัคซีน: จัดทำโปรแกรมให้เหมาะสมกับโรคในฟาร์ม
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity): ป้องกันเชื้อเข้า-ออกจากฟาร์มอย่างเข้มงวด
- ลดความหนาแน่น: หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสุกรอย่างแออัด
- ระบบ All-in/All-out: นำสุกรเข้า-ออกพร้อมกันทั้งโรงเรือนเพื่อตัดวงจรโรค

การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา

ใช้ยาตามเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักและเชื้อฉวยโอกาส โดยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์

ตัวอย่างยาที่แนะนำ:

โรคปอดอักเสบ เอพียี (APP) และเชื้อฉวยโอกาส

- กลุ่ม Penicillins: Amoxicillin → AMOXYKEL 15% LA
- กลุ่ม Cephalosporins: Ceftiofur → CEFOKEL 50 mg/ml
- กลุ่ม Chloramphenicols: Florfenicol → FLORFENIKEL 300 mg/ml
- กลุ่ม Fluoroquinolones: Marbofloxacin → MARBOFLOXAKEL 100 mg/ml

โรคปอดบวมมัคโคพลาสมา (M. hyopneumoniae)

- กลุ่ม Macrolides: Tylosin, Tilimicosin, Tulathromycin → TYLOSINE 20%
- กลุ่ม Chloramphenicols: Florfenicol → FLORFENIKEL 300 mg/ml
- กลุ่ม Fluoroquinolones: Marbofloxacin → MARBOFLOXAKEL 100 mg/ml

การรักษาแบบประคับประคอง

- ยาบรรเทาปวด ลดไข้ แก้อักเสบ: ช่วยให้สุกรสบายตัวและกลับมากินอาหารได้เร็วขึ้น
- เสริมวิตามิน: โดยเฉพาะวิตามินบีรวม เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร
- จัดการน้ำและอาหาร: จัดหาน้ำสะอาดและอาหารที่ย่อยง่าย
- ปรับสภาพแวดล้อม: ดูแลคอกให้อบอุ่น แห้ง สะอาด และระบายอากาศได้ดี

